

ХЕДЛАНД ЦИНК

ЕО ТОР

НЕОРГАНИЧЕН ТОР ЗА ЛИСТНО ПОДХРАНВАНЕ.

СЪСТАВ

Цинк (Zn): 11.2 % w/w като цинков сулфат, водоразтворим

Да се използва само при призната нужда.

Да не се превишават подходящите норми на дозата.

ОПАСНО

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

P273: Да се избягва изпускане в околната среда.

P280: Да се носят предпазни ръкавици / предпазно облекло / предпазни средства за очите / лицето.

P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P391: Съберете разлятото. P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в места за събиране на опасни или специални отпадъци, в съответствие с местната, регионалната, националната и/или международната уредба.

Съдържа: ЦИНКОВ СУЛФАТ



ХЕДЛАНД ЦИНК представлява буфериран течен цинков сулфат за корекция на дефицит на цинк при **царевица, ечемик, картофи, овощни, бобови култури и др.**

ФОРМУЛАЦИЯ

ХЕДЛАНД ЦИНК съдържа 150 г/л цинк (Zn) под формата на сулфат, формулиран с буферни агенти и прилепители за стабилност на формулацията, по-добро покритие и ефективно задържане по листата.

НОРМИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

При нисък дефицит на цинк: 200 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка.

При умерен дефицит на цинк: 400 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка.

При висок дефицит на цинк: 400 мл/дка с последващи повторения в зависимост от установените нужди.

ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

По всяко време след фаза 3-ти лист на културата като рутинно подхранване или при установен дефицит на цинк, когато има достатъчно листна маса, която да поеме продукта при пръскане.

Най-добри резултати се постигат, ако пръскането се извършва рано сутрин или вечер, когато в растението има достатъчно влага. Да не се прилага при високи температури, условия на суша или друг вид стрес за културата.

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР**Преди употреба разклатете добре контейнера с продукта!**

Резервоарът на пръскачката се напълва с половината от необходимото количество вода, след което при включена бъркалка се прибавя **ХЕДЛАНД ЦИНК**. Допълва се с останалата част от водата. Прилага се веднага след приготвяне на работния разтвор.

СЪВМЕСТИМОСТ

ХЕДЛАНД ЦИНК е съвместим с голям брой продукти прилагани чрез листно пръскане. Прочетете етикета на другия продукт(и) преди смесване с **ХЕДЛАНД ЦИНК**.

УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от замръзване – да се съхранява при температури над 5°C.

Да не се съхранява на пряка слънчева светлина. Да се държи далече от достъп на деца.

Да се държи далече от храни, напитки и храни за животни.

Партиден номер: означен на опаковката

Срок на годност: 3 години от датата на производство означена на опаковката

ПРОИЗВОДИТЕЛ

FMC Agro Limited

Rectors Lane, Pentre, Deeside

Flintshire, CH5 2DH, U.K.

www.fmc-agro.co.uk

Лице, което пуска продукта на пазара:

ФМС Агро България ЕООД

София 1680, бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, етаж 5, офис 59

тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44

www.fmcagro.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

5 Л (6.75 КГ)

Пакетиран в кашони от 4x5 л.