

# ПАРА ЗОМЕР®

**ОПАСНО!**

**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА!**

**Преди употреба прочетете внимателно етикета!**

**За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкцията за употреба!**

**Функция на ПРЗ: ИНСЕКТИЦИД, АКАРИЦИД**

ПАРА ЗОМЕР е продукт на парафинова основа с отлично действие срещу щитосни въшки и зимни яйца на акари по растителните видове. Действието му се основава на образуването на въздухонепропусклив маслен филм, който покрива незабележимо неприятелите и техните яйца и ги задушава (асфикция).

**Вид на продукта:** емулсия

**Разрешен за употреба в Р. България** със Заповед № РД 09-791/28.12.2002 г. на МЗГ и с Удостоверение за удължаване на разрешението за предлагане на пазара и употребата на ПРЗ № 0340/24.11.2005 г.

**Дата на производство:** виж опаковката

**Номер на партидата:** виж опаковката

**Срок на годност:** най-малко 2 години

**Категория на употреба:** III-та – свободна (продуктът може да се прилага от лица навършили 18 г.)

**Карантинен срок:** не се изисква

Информационният лист за безопасност е на разположение на потребителя при поискване.

Съдържание на опаковката: **20 л (17.5 кг)**

**Вносител:**

“Хеминова България и Румъния” ЕООД  
бул. „България“ №102  
бизнес-център „Беллиссимо“, офис 59  
София 1680  
Тел.: (02) 818 56 56, Факс: (02) 854 88 44  
cheminova.bg@cheminova.com  
www.cheminova.bg

**Производител:**

Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG  
Stader Elbstrasse  
D-21683 Stade  
www.cheminova.de



**Активно вещество:** 654 г/л парафиново масло (75%)

**Предупреждения за опасност**

H411:Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**Препоръки за безопасност**

P391 Съберете разлятото.

P501 Изхвърлете съдържанието/опаковката в съответствие с местните разпоредби.

**Област на приложение:**

- Срещу зимни яйца на червен овощен акар (*Ranonychus ulmi* Koch.) – 3% (3 л в 100 л вода) при ИПВ над 10-15 яйца на плодна клонка.

Момент на приложение: Пръскането се извършва късно през зимата(началото на пролетта: от февруари до началото на април), когато започне набъбването на пъпките до фаза „миши уши“.

Количество на работния разтвор: 40-150 л / дка, но при много възрастни или обемни оформени насаждения се изразходват 180-200 л.

Приложение: максимум един път през вегетацията.

- Срещу калифорнийска щитоносна въшка (*Quadraspidiotus perniciosus* Comst.) – зимно пръскане – 2% (2 л в 100 л вода).

Момент на приложение: Пръскането се извършва през зимата от окапване на листата до започване на набъбването на пъпките.

Количество на работния разтвор: 40-150 л / дка, но при много възрастни или обемни оформени насаждения се изразходват 180-200 л.

Приложение: Максимум две пръскания през 10 дни.

**Декоративни растения:**

- **Като козметично средство** за възстановяване на гланца по листата и премахване на праха и петната от варовик – 0.5%

- **Срещу щитоносни въшки – 2%**

Момент на приложение: при наличие

Приложение: максимум 2 пръскания през 10 дни.

Хеминова България и Румъния” ЕООД не упражнява контрол върху транспортирането, съхранението и употребата на тези продукти след тяхната продажба. Фирмата не носи отговорност за несъответствие в качеството или ефекта при приложение на продуктите в резултат на неспазване на посочените в етикета условия за транспортиране, съхранение и употреба.