

**ОПАСНО!**  
**ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**  
**Преди употреба прочетете внимателно етикета**

**ЕUH401: За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба!**

Поискайте Информационния лист за безопасност за този продукт от Вашия дистрибутор или го изтеглете на адрес: [www.dupont.bg](http://www.dupont.bg)



**Внимание!**

ГРУПА	В	ХЕРБИЦИД
-------	---	----------

**РЕФАЙН™ ЕКСТРА  
REFINE™ EXTRA**

**ХЕРБИЦИД**

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ:**

**H410** Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

**ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:**

**P391** Съберете разлятото.

**P501** Съдържанието / съдът да се изхвърли на одобрено за това място, съгласно националното законодателство.

**СПЕЦИАЛНИ СЪВЕТИ ЗА БЕЗОПАСНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРОДУКТА ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**

**SP1** - Да не се замърсяват водите с този продукт или с опаковката. (Да не се почиства оборудването с което се прилага продукта, близо до повърхностни води) Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища

**SPe1** - С цел опазване на подпочвените води, да не се прилага Рефайн™ Екстра или друг продукт, съдържащ трибенурон-метил върху алкални почви ( $\text{pH} > 7$ ) през есента в доза, надвишаваща или равна на 1,25 г/дка активно вещество трибенурон – метил.

**SPe2** – С цел предпазване на водните организми, да не се прилага Рефайн™ Екстра при култури, отглеждани върху изкуствено дренирани почви, когато културата не е достигнала ВВСН 20 (начало на братене).

**SPe3** - Да се осигури нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води, с цел опазване на водните организми.

**ФУНКЦИЯ НА ПРЗ:** Рефайн™ Екстра е системен, вегетационен сулфонилуреен хербицид за контрол на широколистни плевели, включително устойчиви на 2,4Д при житни култури (пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале).

**ФОРМУЛАЦИЯ:** Рефайн™ Екстра е формулиран по патентована от ДюПон SX™ технология като водоразтворими гранули (СГ).

**АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА:** трибенурон – метил - 167 г/кг и тифенсулфурон – метил – 333 г/кг

**Химично наименование на активните вещества**

**Трибенурон - метил:** 2-[4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-yl(methyl)carbamoylsulfamoyl] benzoic acid

**Тифенсулфурон - метил:** 3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazin-2-ylcarbamoylsulfamoyl) thiophene-2-carboxylic acid

**Химична група на активните вещества:**

Сулфурилуреи

**КАТЕГОРИЯ НА УПОТРЕБА:** Непрофесионална - Може да се прилага от лица, навършили 18 години.

**КАРАНТИНЕН СРОК:** не се налага (най-късно приложение в ВБСН 39 – напълно развит флагов лист).

**ТЕЛЕФОН ЗА СПЕШНИ СЛУЧАИ**

УМБАЛСМ „Пирогов” - София, Токсикологично отделение  
тел. 02/915 44 09 и 02/915 43 346.

Телефон на ДюПон за спешни случаи (CHEMTREC) с информация на български език:  
+(359)-32570104

**МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ**

Рефайн™ Екстра е е системен селективен хербицид, който се поема от корените и листата и се придвижва към вегетационните върхове на плевелите, скоро след прилагането му. Действието му се основава на потискането на ензима ацетолактатна синтаза (ALS). В чувствителните плевели деленето на клетките спира часове след прилагането на продукта, което предизвиква незабавно спиране на растежа. Видимите симптоми (промяна в цвета на плевелите, избеляване, некроза) се наблюдават до 1-2 седмици след третирането, което зависи и от условията на растеж и чувствителността на плевелите. По-малко чувствителните и по-големи плевели може да не бъдат унищожени напълно, но остават потиснати в своето развитие и не конкурират културата по отношение на водата и хранителните вещества.

**РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБА**

Рефайн™ Екстра е разрешен в Р. България със Заповед РД11-682/21.04.2015 на Изпълнителния директор на БАБХ за следните употреби:

Култура	Вредител	Доза	Момент на приложение	Карантинен срок
Пшеница, ечемик, овес, ръж, тритикале	Едногодишни и многогодишни широколистни плевели	6 г/дка	Вегетационно, във фаза от котиледони до 2 – 4 същински лист на широколистните плевели и от 3ти лист до пълна поява на флагов лист (BBCN 39) за житната култура	Не се налага

За постигане на максимален ефект, Рефайн™ Екстра трябва да се прилага в ранни фази на активно растящите плевели, след 3ти лист на културата.

Рефайн™ Екстра се смесва с вода за приложение. Препоръчителен обем на работния разтвор – 10 – 40 л/дка. В зависимост от плевелното покритие и вида на плевелите, използваният работен разтвор трябва да осигури пълно и равномерно покритие на листната маса.

### СПЕКТЪР НА ДЕЙСТВИЕ

Рефайн™ Екстра е ефективен срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при житни култури.

В долната таблица е представен непълен списък на плевелите, контролирани от Рефайн™ Екстра, според тяхната чувствителност:

Едногодишни и многогодишни плевели (които са на полето към момента на третирането)	Ефикасност
Бръшлянолистно велицденче ( <i>Veronica hederifolia</i> )	Ч
Бяла лобода ( <i>Chenopodium album</i> )	СЧ
Велицденче ( <i>Veronica agrestis</i> )	Ч
Войничича ( <i>Syimbrium (Descurainia) Sophia</i> )	СЧ
Врабчови чревца ( <i>Stellaria media</i> )	СЧ
Врабчово семе ( <i>Lithospermum arvense</i> )	Ч
Глушина, видове ( <i>Vicia spp.</i> )	Ч
Горуха, видове ( <i>Lepidium spp.</i> )	Ч
Гръцка коприва ( <i>Urtica urens</i> )	Ч
Див мак ( <i>Papaver rhoeas</i> )	Ч
Дива ряпа ( <i>Raphanus raphanistrum</i> )	СЧ
Диплотаксис ( <i>Diplotaxis erucoides</i> )	Ч
Живовляк, видове ( <i>Plantago spp.</i> )	Ч
Здравец ( <i>Geranium spp.</i> )	СЧ
Киселец, видове ( <i>Rumex spp.</i> )	УЧ
Киселиче, видове ( <i>Oxalis spp.</i> )	Ч
Колендро ( <i>Bifora radians</i> )	Ч
Кориандър, самосевка ( <i>Coriandrum sativum</i> )	Ч
Лайка ( <i>Matricaria spp.</i> )	Ч
Лапад ( <i>Rumex patientia</i> )	СЧ
Лепка ( <i>Gallium spp.</i> )	УЧ
Летен горицвет ( <i>Adonis aestivalis</i> )	Ч
Мак ( <i>Papaver rhoas</i> )	Ч
Млечок, млечка ( <i>Sonchus arvensis</i> )	Ч
Мъртва коприва ( <i>Lamium spp.</i> )	Ч
Обикновен спореж ( <i>Senecio vulgaris</i> )	Ч

Обикновен щир ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	Ч
Обикновена колянка ( <i>Spergula arvensis</i> )	Ч
Обикновено огнивче ( <i>Anagallis arvensis</i> )	Ч
Овчарска торбичка ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> )	Ч
Паламида ( <i>Cirsium arvense</i> )	Ч
Пача трева ( <i>Polygonum aviculare</i> )	Ч
Персийско великденче ( <i>Veronica persica</i> )	Ч
Петниста бударица ( <i>Galeopsis tetrahit</i> )	Ч
Пипериче ( <i>Persicaria spp.</i> )	СЧ
Поветицовидно фасулче ( <i>Polygonum convolvulus</i> )	Ч
Повитица ( <i>Convolvulus arvensis</i> )	УЧ
Поддумче, видове ( <i>Anthemis spp.</i> )	Ч
Полска незабравка ( <i>Myosotis arvensis</i> )	СЧ
Полска теменуга ( <i>Viola arvensis</i> )	УЧ
Полски невен ( <i>Calendula arvensis</i> )	Ч
Полски рожец ( <i>Cerastium arvense</i> )	СЧ
Полско великденче ( <i>Veronica arvensis</i> )	Ч
Попова лъжичка ( <i>Thlaspi arvense</i> )	СЧ
Прасковолистно пипериче ( <i>Polygonum persicaria</i> )	Ч
Ралица ( <i>Consolida regalis</i> )	Ч
Рапица, самосевка ( <i>Brassica napus</i> )	Ч
Росопас ( <i>Fumaria officinalis</i> )	УЧ
Самосевка слънчоглед ( <i>Helianthus annuus</i> )	Ч
Синап ( <i>Sinapis arvensis</i> )	Ч
Синчец ( <i>Scilla spp.</i> )	УЧ
Синя метличина ( <i>Centaurea cyanus</i> )	Ч
Слез ( <i>Malva spp.</i> )	Ч
Фасулче ( <i>Fallopia convolvulus</i> )	Ч
Черен синап ( <i>Brassica nigra</i> )	Ч

СЧ – силно чувствителен плевел (Ефикасност > 95%)

Ч – чувствителен плевел (Ефикасност 85 – 90 %)

УЧ – умерено чувствителен плевел (Ефикасност 70 – 85%)

У – устойчиви плевели (< 60% контрол)

#### **ПРЕПОРЪКИ ПРИ УПОТРЕБА / БЕЗОПАСНОСТ ЗА КУЛТУРАТА:**

За постигане на оптимален резултат, Рефайн™ Екстра трябва да се използва съгласно препоръките, посочени в този етикет. Производителят не носи отговорност за загуби или щети, получени при неправилна употреба на продукта. Потребителят на своя отговорност поема рисковете, свързани с нерегламентираната употреба на продукта.

Рефайн™ Екстра е селективен спрямо всички сортове и хибриди пшеница, ечемик, ръж, овес и тритикале.

Рефайн™ Екстра не трябва да се прилага при култура, страдаща от стрес вследствие на наводнение, заливане с вода, нападение от болести и неприятели, мраз, липса на хранителни вещества или други фактори, задържащи развитието на културата.

Рефайн™ Екстра може да се използва при температури над 5°C.

Върху алкални почви, периода на приложение е в края на зимата и рано през пролетта.

С продукта да се третира при тихо и спокойно, без вятър време. За постигане на пълен ефект от пръскането е необходимо до три часа след третирането да не вали дъжд.

Да се избягва директния или индиректен контакт на продукта (в резултат на отвяване на работния разтвор) с други култури.

За да бъдат защитени водните организми, да се спазва нетретирана буферна зона от 5 метра до повърхностни води.

**Максимална доза:** 7,5 г/дка

**Максимален брой третирания през вегетацията:** 1

**Интервал, който трябва да се спазва между третирането и достъпа на хора и животни до третираната култура:** 6 часа.

Можете да проверите максимално допустимите нива на остатъчни количества от активните вещества на уеб-адрес: [http://ec.europa.eu/sanco\\_pesticides/public/index.cfm](http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm)

#### **СЛЕДВАЩИ КУЛТУРИ / ПРОПАДАНЕ НА КУЛТУРАТА:**

При пропадане на културата, може да бъде засята само зимна житна култура (пшеница, ечемик, овес), с интервал на изчакване 3 седмици, след прилагането на Рефайн™ Екстра.

След нормалното прибиране на третираната култура, няма ограничения в избора на следващата култура в сейтбооборота.

#### **УСЛОВИЯ ЗА КАЧЕСТВЕНО ПРЪСКАНЕ/ ОТВЯВАНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР:**

Да се използват дюзи, намаляващи разпръскването или дюзи, които образуват по-големи капки. Нагласете щангата на пръскачката така, че да се намали до максимум възможността от изпаряване или отвяване на капките от изпръсквания разтвор. Избягвайте пръскиане, ако вятъра надвишава 15 км/ч. При пръскиане в топло и сухо време, дюзите трябва да се нагласят така, че да изпръскват по-едри капки, за да се намали възможността от изпаряване. Да се избягва отвяването на работен разтвор към съседни култури или попадането му в канали, повърхностни води или други водоизточници. Да не се пръска или работи с продукта на разстояние, по-малко от 5 метра от кладенци, канавки или канализационни системи, както и на места, където дъждовните води могат да отнесат работния разтвор към временни или постоянни водоизточници.

#### **РЕЗИСТЕНТНОСТ**

Когато на едно и също поле се използват хербициди с един и същ начин на действие в продължение на няколко години могат да се появят по-малко чувствителни биотипове плевели, които да станат доминантни в това поле.

Един плевел се счита за резистентен към даден хербицид, ако не се повлиява от правилно извършено третиране в препоръчителните дози при оптимални климатични условия. За да се избегне развитието на резистентност в даден вид плевел се препоръчва редуване на продукти с различен начин на действие и достатъчна ефикасност.

Активните вещества, които влизат в състава на Рефайн™ Екстра принадлежат към групата на сулфунилуреите (HRAC група B).

В случай на съмнения за възникнала резистентност, свържете се с нашия регионален представител.

#### **ИНТЕГРИРАНА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА**

ДюПон насърчава използването на методи за интегрирана борба срещу плевелите при житни култури. Рефайн™ Екстра може да се използва като част от стратегия за Интегрирана растителна защита, като се комбинира с използването и на други средства и методи за контрол.

Принципите на интегрираната борба включват наблюдения на полето, идентифициране на плевелните видове, проследяване на популациите, както и редуване на хербициди с различен начин на действие.

## ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Убедете се, че пръскачката е чиста и в добро работно състояние. След това я калибрирайте, за да се постигне добро покритие на растителните части от плевелите. Напълнете наполовина резервоара с вода и пуснете бъркалката. Добавете необходимото количество Рефайн™ Екстра в резервоара. Изплакнете опаковката и добавете водата в резервоара. Продължете с разбъркането, докато пълните догоре пръскачката с вода и по време на пръскането.

Прилагайте работния разтвор веднага, след като е готов.


## СМЕСИМОСТ

Рефайн™ Екстра е смесим с повечето регистрирани продукти за растителна защита. При смесване, трябва да се съблюдават най-рестриктивните ограничения в етикетите на партниращите продукти, като не трябва да се надхвърлят посочените дози. Да не се смесва с продукти, които имат изрична забрана за това.

### Последователност при смесването:

При смесване на различни типове формулации, да се спазва по-долу описаната последователност. Преди добавянето на следващ продукт, изчакайте до пълното смесване на предишния.

1. Водоразтворими торби
2. Водоразтворими гранули (СГ)
3. Вододиспергируеми гранули (ВГ)
4. Водонамокрими прахове (ВП)
5. Суспензионни концентрати (СК)
6. Суспоемулсии (СЕ)
7. Маслена дисперсия (ОД)
8. Емулсия във вода (ЕВ).
9. Емулсионни концентрати (ЕК).
10. Водоразтворими концентрати (СЛ)



## ПОЧИСТВАНЕ НА ПРЪСКАЧНАТА ТЕХНИКА

След приключване на третирането, изплакнете добре резервоара на пръскачката и прочистете маркучите, щангата, филтрите и дюзите с чиста вода, за да се намали риска от изсъхването на остатъци от работния разтвор, които трудно могат да бъдат отстранени. Почистете и останалото оборудване, което сте използвали при приготвянето на работния разтвор.

Ако работния разтвор в пръскачката съдържа само Рефайн™ Екстра, почистването на пръскачката може да стане само с вода, както следва:

1. След приключване на третирането, изпразнете напълно резервоара.
2. Изплакнете много добре вътрешната повърхност на резервоара с чиста вода (напълнете най - малко 10% от обема на резервоара). Убедете се, че сте премахнали всички видими остатъци.

3. Прочистете помпата и щангата. Отделно изплакнете добре филтрите и дюзите с вода.
4. Повторете Стъпка 2 и отцедете резервоара

Водата от изплакването може да бъде изпръскана върху третираната площ.

Не забравяйте да измиете пръскачката и отвън.

Ако работния разтвор в пръскачката съдържа освен Рефайн™ Екстра и друг продукт, оборудването трябва да се почиства, както следва:

1. След приключване на третирането, изпразнете напълно резервоара.
2. Изплакнете много добре вътрешната повърхност на резервоара с чиста вода (напълнете най – малко 10% от обема на резервоара). Убедете се, че сте премахнали всички видими остатъци . Водата от изплакването може да бъде изпръскана върху третираната площ.
3. Напълнете резервоара на пръскачката до 10% от обема му с чиста вода и добавете 3% домакинска белина, за да получите 1% разтвор (1литър белина / 100 литра вода). Включете пръскачката и оставете да циркулира през маркучите и щангата за около 10-15 минути.
4. Изпразнете пръскачката през маркучие и щангата и оставете резервоара да се изцеди на безопасно място. Изплакнете пръскачката с чиста вода (най – малко 10% от обема на резервоара).
5. Отстранете дюзите и филтрите и ги почистете отделно в същия разтвор с белина (вж. т. 3).

Не забравяйте да измиете пръскачката и отвън.

#### **ПРЪСКАЧКАТА НЕ ТРЯБВА ДА СЕ ПОЧИСТВА В БЛИЗОСТ ДО КЛАДЕНЦИ ИЛИ ДРУГИ ВОДНИ ИЗТОЧНИЦИ, ИЛИ ДО ДРУГИ КУЛТУРНИ РАСТЕНИЯ.**

По време на почистването трябва да се вземат всички необходими мерки за безопасност. Водата от плакненето трябва да се третира според местните разпоредби.

#### **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ И ЛИЧНО ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО**

С продукта да се работи като се спазват указанията, посочени в етикета. Неправилната употреба може да увреди сериозно Вашето здраве и/или културите, които отглеждате.

Да се работи с чисто оборудване.

Да се използва лично защитно облекло: предпазни ръкавици, очила и предпазен костюм – да се спазват изискванията, посочени в информационния лист за безопасност. Работното облекло да се почиства преди повторна употреба.

Да се осигури подходяща вентилация в помещението за работа. Да се избягва вдишването на изпарения при отварянето на опаковката. Да не се вдишва аерозола от изпръсквания разтвор.

Да се пази от достъп на деца.

Работният разтвор трябва да се приготвя съгласно указанията, посочени в този етикет. Приготвеният работен разтвор трябва да се използва възможно най-бързо и да не се съхранява.

Да се измиват ръцете преди почивка и след работа с продукта. При работа с продукта да не се пие, пуши и яде.

Да се съхранява далеч от напитки, храна и фуражи.

В случай на злополука или неразположение, потърсете веднага медицинска помощ, като по възможност носите етикета със себе си.

## **ПЪРВА ПОМОЩ И МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТИ**

**Съдържа трибенурон – метил - може да предизвика алергична реакция!**

! Да не се дава нищо през устата на лице в бъдъзнание!

- При контакт с кожата:** съблечете работното облекло и измийте тялото със сапун и вода. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо.
- При попадане в очите:** Изплакнете очите обилно с вода, не по-малко от 15 минути. Консултирайте се с лекар, ако е необходимо.
- При вдишване:** Да се отведе пострадалия на чист въздух. Да се осигури кислород ако е необходимо. Консултирайте с лекар .
- При погълъщане:** Да не се предизвика повръщане без лекарски съвет. Да не дава нищо през устата на човек в бъдъзнание. Ако пострадалият е в съзнание: изплакнете устата с вода. Консултирайте се с лекар.

Няма специфичен антидот. Прилага се симптоматично лечение.

Индикации за лечение: В случай на метхемоглобинемия да се приложи 1% разтвор на метиленово синьо.

## **СЪХРАНЕНИЕ**

Опаковките да се съхраняват добре затворени на сухо, хладно и добре проветриво място.

Да се съхранява далече от достъп на деца. Да не се съхранява заедно с храни, напитки и фуражи. Да не се съхранява при температура, по-висока от 35°C.

**ТРАНСПОРТИРАНЕ:** Съгласно разпоредбите за транспортиране на химични вещества. Повече информация е представена в информационния лист за безопасност на продукта.

## **МЕРКИ В СЛУЧАЙ НА ПОЖАР**

Подходящи средства при пожар – водна струя, сух химикал, пяна, CO2. Пожарникарите да носят защитни костюми и дихателни апарати.

## **УНИЩОЖАВАНЕ НА ПРАЗНИТЕ ОПАКОВКИ**

**Унищожаване на продукта:**

Остатъците от продукта да се унищожават в одобрени за това места. Да не се допуска замърсяване на води, храни или фуражи.

**Унищожаване на опаковката:**

Опаковката да се изплакне трикратно преди унищожаването ѝ. Празните опаковки да не се използват повторно или за други цели. Да не се допуска замърсяване на водоеми, водоизточници и канализацията с продукта или неговата опаковка. Празните опаковки могат да бъдат надупчени и унищожени чрез изгаряне или други методи, одобрени от националните власти.

Да не се замърсяват с опаковките естествени или изкуствени водни източници.

## **МЕРКИ ПРИ ИНЦИДЕНТНО РАЗСИПВАНЕ ИЛИ РАЗЛИВАНЕ**

Да се носи лично предпазно облекло.

Да не се излива в повърхностни води или в канализацията. Разсипаното количество продукт да се събере посредством вакуум и да се постави в подходящ съд, за последващо унищожаване съгласно местните законови разпоредби. Следвайте инструкциите в информационния лист за безопасност.

## **ЕКОТОКСИЧНОСТ**

Рефайнитм Екстра е токсичен за водните организми. Да не се работи и пръска с продукта на разстояние по-малко от 5 метра от канализации, кладенци и канавки. Да не се пръска на по-малко от 5 метра от естествени и изкуствени водоизточници.

**ОПАКОВКА:** 180 г

**Дата на производство:**

**Партиден №**

**СРОК НА ГОДНОСТ:** 2 години от датата на производство.

**ПРОИЗВОДИТЕЛ:** ДюПон Интернешънъл Оперейшънс, Швейцария

**ВНОСИТЕЛ:** ДюПон България ЕООД , София , Бизнес парк София, сграда 1А, ет.1, тел: 489 91 55 ; факс: 489 91 56

## **ОТКАЗ ОТ ПРАВА**

ДюПон гарантира високото качество на продукта, който може да се прилага съгласно подробните инструкции върху етикета. Но поради факта, че компанията не е в състояние да следи за начина на съхранение, на работа с продукта, на смесването му, нито на общите условия за употреба, то тя не може да носи отговорност за неудачите, загубите или други щети, дължащи се на неправилно съхранение, употреба, прилагане или погрешно му използване.

