

ВЕРДИЛАКС

РАЗТВОР НА КОНЦЕНТРИРАНИ АМИНОКИСЕЛИНИ ОТ РАСТИТЕЛЕН ПРОИЗХОД

СЪСТАВ

Общо аминокиселини:	380 г/л (34.5% w/w)
Свободни аминокиселини:	100 г/л (9.1% w/w)
Азот (по Келдал):	60 г/л (5.5% w/w)
Органичен въглерод:	160 г/л (14.5% w/w)

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Продуктът не следва да се счита за опасен съгласно CLP (Регламент (ЕО) № 1272/2008).

Вердилакс съдържа комплекс от свободни L- α аминокиселини от растителен произход. Продуктът е ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните фази на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж. Вердилакс подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата.

НОРМИ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

1. Листно приложение:

Обща доза за листно приложение: 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л/дка.

Житни култури: Прилага се 20-30 дни след сеитба. Повторение 10 дни след братене на пшеницата и другите зърнено-житни култури, при необходимост.

Картофи: Прилага се рано през сезона, когато растенията имат достатъчно листна маса, за да поемат разтвора. Повторно приложение да се извърши точно преди цъфтежа.

Захарно цвекло: Прилага се рано през сезона, когато растенията имат достатъчно листна маса, за да поемат разтвора. Повторно приложение се прави при необходимост в интервали от 15-20 дни.

Зеленчуци: Листното пръскане трябва да започне 1-2 седмици след засаждане или покълване на културата.

Овощни дръвчета, грозде, маслини, цитруси, шам-фъстък и др.: Прилага се преди цъфтежа и след завързването на плода. Повторно приложение се прави при необходимост по време на фаза нарастване на плода.

Декоративни растения: Извършват се няколко пръскания през целия цикъл на развитие, като се започне рано през сезона.

Този продукт не трябва да се прилага при силно слънце или при температури над 25°C. Ако е възможно, за най-добър резултат, пръскането да се извършва вечер или рано сутрин.

2. Приложение с напояване:

Прилага се обща доза от 100-200 мл/дка с водата за напояване.

Овощни видове: 150-200 мл/дка

Декоративни растения и цветя: 125 мл/дка

Житни и други екстензивни култури: 100 мл/дка

Зеленчуци и други култури: 100 мл/дка

3. Приложение с хидропоника:

Прилага се обща доза от 100 мл/дка.

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

Внимателно прочетете етикета на продукта преди прилагане.

Разклатете контейнера добре преди отваряне и употреба.

Оборудването за пръскане трябва да бъде чисто.

Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода, включете бъркалката и добавете желаното количество **Вердилакс**. Изплакнете добре празната опаковка на продукта и добавете промивните води в резервоара на пръскачката, допълнете пръскачката с вода и пръскайте незабавно след приготвянето на работния разтвор. Разбъркането на работния разтвор трябва да продължава през цялото време на приложение на продукта. След употреба почистете основно пръскачката.

СЪВМЕСТИМОСТ

Вердилакс е физически и химически съвместим с широка гама от селскостопански продукти. Посъветвайте се със своя доставчик за най-актуалната информация. Винаги четете етикета на партниращия продукт внимателно, преди да го смесите с Вердилакс.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температура над 5°C.

Да се съхранява на хладно, проветриво и подходящо за съхранение място. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Да се пази далече от досег на деца. Да се държи далеч от храна, напитки и фуражи.

Партиден №: Означен на опаковката

Срок на годност: 3 години от датата на производство

ПРОИЗВОДИТЕЛ

FMC Agro Limited

Rectors Lane, Pentre, Deeside

Flintshire, CH5 2DH, U.K.

www.fmc-agro.co.uk

Лице, което пуска продукта на пазара:

ФМС Агро България ЕООД

София 1680, бул. „България“ №102

БЦ „Беллиссимо“, етаж 5, офис 59

тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44

www.fmcagro.bg

СЪДЪРЖАНИЕ

10Л (11КГ)

Пакетирано в кашони 2 x 10 л