

Вердилакс СаВ

ТЕЧЕН ТОР НА ОСНОВАТА НА РАСТИТЕЛНИ АМИНОКИСЕЛИНИ С КАЛЦИЙ (Са) И БОР (В)

СЪСТАВ

Общо аминокиселини:	263 г/л (20% w/w)
Свободни аминокиселини:	70 г/л (5.3% w/w)
Калций (СаО):	120 г/л (9.2% w/w)
Бор (В):	1,1 г/л (0.1% w/w)

ОПАСНО

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

H302: Вреден при поглъщане.

H318: Предизвиква сериозно увреждане на очите.

P264: Да се измият ръцете старателно след употреба.

P280: Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P301+310: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P305+351+338: ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501: Съдържанието/съдът да се изхвърли в пунктове за събиране на опасни или специални отпадъци.

Съдържа: КАЛЦИЕВ АМОНИЕВ НИТРАТ



Вердилакс СаВ съдържа комплекс от свободни L-α аминокиселини от растителен произход, налични в растенията. Вердилакс СаВ е ефикасно решение, подпомагащо облекчаването на стреса при растенията, дължащ се на неблагоприятни климатични и почвени условия по време на важните стадии на растеж като вкореняване, цъфтеж, завързване на плода и периодите на усилен растеж.

Вердилакс СаВ подобрява цъфтежа и завързването на плода, а оттам повишава добива и качеството на реколтата.

Вердилакс СаВ има предпазно и лечебно действие при физиологични смущения, причинени от недостиг на калций и бор: горчиви плодове при ябълки и круши, гниене на нарастващия връх при домати, пипер, пъпеш и дини. Повишава устойчивостта на плодовете при съхранение и транспорт.

НОРМИ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Вердилакс СаВ може да се прилага листно или почвено.

1. Листно приложение:

Обща доза за листно приложение: 50-150 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка.

Житни култури: Прилага се в доза 100 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, след фаза 3-ти лист на културата, когато растенията имат достатъчно развита листна повърхност, за да поемат разтвора.

Картофи: Прилага се в доза 100-150 мл/дка в работен разтвор от най-малко 20 л вода/дка, когато растенията имат достатъчно развита листна площ, за да поемат разтвора. Повторение в началото на формиране на клубените и по време на тяхното нарастване.

Други полски култури: Прилага се в доза 100 мл/дка в работен разтвор от най-малко 20 л вода/дка, 20-30 дни след сеитба.

Оранжевийни зеленчуци: Прилага се в доза 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, 15 дни след засаждане. Повторение преди цъфтеж, след завързване на плода и по време на нарастване на плода.

Ягоди: Прилага се в доза 150 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, след пресаждане. Повторение преди цъфтеж, след завързване на плода и по време на нарастване на плода.

Овощни дръвчета: Прилага се в доза 50-100 мл/дка в работен разтвор от 20 л вода/дка, преди цъфтеж. Повторение след завързване на плода и по време на нарастване на плода.

2. Почвено приложение:

50-200 мл/дка на всяко приложение. Повторно приложение може да има през целия цикъл на интервали от 15-20 дни.

НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Разклатете контейнера добре преди отваряне и употреба.

Оборудването за пръскане трябва да бъде чисто. Напълнете резервоара на пръскачката до половината с вода, включете бъркалката и добавете желаното количество Вердилакс СаВ. Изплакнете хубаво контейнера, добавете промивната течност в резервоара на пръскачката, довършете пълненето и пръскайте незабавно. Разбъркането на работния разтвор трябва да продължава през цялото време на приложение на продукта. След употреба почистете основно пръскачката. След употреба основно почистете пръскачката.

СЪВМЕСТИМОСТ

Вердилакс СаВ е физически и химически съвместим с широка гама от селскостопански продукти. Посъветвайте се със своя доставчик за най-актуалната информация. Винаги четете етикета на партниращия продукт преди да го смесите с Вердилакс СаВ.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от измръзване. Да се съхранява при температура над 5°C. Да се съхранява на хладно, проветриво подходящо за съхранение място. Да не се съхранява на пряка слънчева светлина или в близост до източници на топлина. Да се пази далече от досег на деца. Да се държи далеч от храна, напитки и фуражи.

ПРОИЗВОДИТЕЛ

FMC Agro Limited, Rectors Lane, Pentre, Deeside
Flintshire, CH5 2DH, U.K., www.fmc-agro.co.uk

Лице, което пуска продукта на пазара:

ФМС Агро България ЕООД, София 1680, бул. „България“ №102
БЦ „Белиссимо“, етаж 5, офис 59, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44
www.fmcagro.bg

СЪДЪРЖАНИЕ
10 Л (13.1КГ)

Пакетирано в кашони 2 x 10 л