

ФОРЧЪН

Прилепител за пестицидни разтвори

ВНИМАНИЕ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТ

H317 Може да причини алергична кожна реакция.

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите

H412 Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.



EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

ПРЕПОРЪКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P302+352 ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода.

P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P310 Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.

P333+313 При поява на кожно дразнене или обрив на кожата: Потърсете медицински съвет/помощ.

P362 + P364 Свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.

P501 Изхвърлете съдържанието / контейнера като опасен отпадък.

ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПРОДУКТА

Специално формулиран продукт предназначен за подобряване на омокрянето, равномерното разпределяне и проникването на пестицидните разтвори при употребата им в селското и горското стопанство.

За употреба в резервоарни смеси с продукти за растителна защита.

СЪСТАВ НА ПРОДУКТА 75% метоксилирано рапично масло + 20% n-бутанол

ФОРМУЛАЦИЯ Емулсионен концентрат (ЕК)

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ 20 мл/дка за всички видове култури

БРОЙ НА ТРЕТИРАНИЯТА Да се прилага винаги в съответствие с инструкциите за приложение на продуктите от резервоарната смес.

Време на приложение заедно с продукти за растителна защита при различни видове култури:

Царевица: Заедно с вегетационен хербицид Хемнико 24СК

Житни: До поява на класа

Рапица: До начало на цъфтеж

Картофи: До начало на формиране на клубените

Краставици: До залагане на плода

Домати: До залагане на плода от първо съцветие

Ябълки/круши: До поява на плодове с големина 5-10 мм

Кайсии, сливи, праскови: До залагане на плодовете

ПРИГОТВЯНЕ НА РАБОТНИЯ РАЗТВОР

Резервоара на пръскачката се напълва с половината от предвиденото количество вода и пестицид в съответствие с инструкциите за употреба на производителя. След това се добавя необходимото количество ФОРЧЪН и останалата половина от водата. Разбъркването на разтвора не бива да спира през цялото време на смесване, транспортиране и пръскане. След употреба оборудването за пръскане трябва внимателно да бъде почистено.

СЪВМЕСТИМОСТ

ФОРЧЪН е съвместим с почти всички продукти за растителна защита за листно приложение. За информация относно конкретни резервоарни смеси, моля консултирайте се с Вашия дистрибутор или търговски представител.

СЪХРАНЕНИЕ

Да се пази от замръзване. Да се съхранява при температури над 5°C.

Да се съхранява на сухо и хладно място подходящо за съхранение на продукти за растителна защита. При температури под 0°C продуктът може да стане по-гъст и мътен. Нормалното му състояние се възвръща при температури над 0°C.

ЗАЩИТА НА ОПЕРАТОРА

Следвайте инструкциите за защита на оператора, дадени за продуктите за растителна защита в резервоарната смес. Когато има разминаване в изискванията за личното защитно оборудване, да се взимат предвид най-високите мерки за защита.

ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Изхвърлянето на ненужните количества от продукта и на неговата опаковка трябва винаги да бъдат съобразени със Закона за управление на отпадъците.

СРОК НА ГОДНОСТ 2 години от датата на производство

Партиден номер и дата на производство: отбелязани на опаковката

ПРОИЗВОДИТЕЛ

FMC Agro Limited

Rectors Lane, Pentre, Deeside

Flintshire, CH5 2DH, U.K.

<http://www.fmc-agro.co.uk/>

Лице, което пуска продукта на пазара:

“ФМС Агро България“ ЕООД, София 1528, бул. „Искърско шосе“ №7, ТЦ „Европа“, Сграда 7, Етаж 4, Офис 8, тел. (02) 818 56 56, факс (02) 854 88 44, www.fmcagro.bg

ОПАКОВКА

1л (0.9 кг)

5л (4.5 кг)